


CEPCA

EN PARLAM?

EL TABAC


EL TABAC



NICOTIANA TABACUM



ORIGENS DEL TABAC





CIGARRETS ELECTRÒNICS I VAPERS

-NICOTINA

-SABORITZANTS

-SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES



RISCOS:

-IRRITEN I DANYEN ELS PULMONS

-PODEN PORTAR A FUMAR CIGARRETS I A CONSUMIR ALTRES TIPUS DE TABAC

-PODEN CAUSAR GREUS DANYS PULMONARS I FINS I TOT LA MORT



SHISHAS



ELS PRINCIPALS COMPONENTS

NICOTINA



QUITRANS




IRRITANTS



MONÒXID DE CARBONI



COMPONENTS DEL CIGARRRET



QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ EL CONSUM HABITUAL?

EL CONSUM HABITUAL PROVOCA:

- Disminució de la capacitat pulmonar
- Envelliment prematur de la pell de la cara
- Minvament dels sentits del gust i l'olfacte
- Mala olor en general, la roba, el cos
- Mal alè
- Color groguenc de dits i dents
- Tos i expectoracions, sobretot matutines
- Despesa de diners






Cerebro



Fumar es la causa principal del accidente cerebrovascular (ACV)

Ojos




El consumo de tabaco triplica el riesgo de padecer cataratas

Boca



Además de causar cáncer de boca, fumar produce periodontitis

Pulmones



El cáncer de pulmón es 23 veces más frecuente en los fumadores

Organo afectado por el cigarrillo

Corazón

El tabaquismo es causa directa de enfermedad coronaria

Estómago

Fumar no sólo causa cáncer; los fumadores también sufren más úlceras

Riñones

El cigarrillo aumenta el riesgo de sufrir cáncer renal

Vejiga

Fumar produce cáncer. El riesgo baja a la mitad a los pocos años de abstinencia

Páncreas


El cigarrillo causa cáncer

Aparato reproductivo

Fumar produce cáncer de cervix y de próstata, además de disfunción eréctil

Principales causas de muerte

En EE.UU., en 1990




CIGARRILLO

El fumador ilustrado


Un reciente informe difundido por el director de Salud Pública de los Estados Unidos expone la lista de enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Las que se suman son: leucemia mieloide aguda, cáncer cervical renal, pancreático, uterino y cervical, aneurisma de aorta abdominal, cataratas y periodontitis.

Qui són els fumadors passius?




PER QUINS MOTIUS PENSABU QUE ELS
ADOLESCENTS COMENCEN A FUMAR

TABAC?




Motius que diuen els estudiants d'Eivissa:

Motiu principal per provar tabac:



Motius que diuen els estudiants d'Eivissa:

Motius per NO fumar tabac:



Estudiants d'Eivissa que han provat el tabac



Mitjana d'edat d'inici 14 anys

Mitjana d'edat fumador diari 14.5 anys

18 anys


12 anys

14 anys


16 anys




7%




35.3%



45.7%



53%



**Si necessites més informació sobre el tema, pots posar-te en
contacte amb nosaltres:**

911323335

Troba'ns en línia

En Parlam?



INSTAGRAM

@cepcaeivissa

Email:

cepca@arquisocial.es